

LANSOPRAZOL 30mg

THUỐC KÊ ĐƠN, THUỐC NÀY CHỈ SỬ DỤNG THEO SỰ KÊ ĐƠN CỦA BÁC SĨ

* THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang chứa :

- Lansoprazol vi hạt 8,5% tương đương Lansoprazol.....30 mg

* DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang.

* QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:

- Hộp 03 vỉ x 10 viên nang.
- Chai 14 viên nang.

* CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị cấp và điều trị viêm thực quản có trào ngược dạ dày - thực quản.
- Loét dạ dày - tá tràng cấp.
- Các chứng tăng tiết toan bệnh lý, như hội chứng Zollinger - Ellison, u đa tuyến nội tiết, tăng đường bào hệ thống.

* CÁCH DÙNG – LIỀU DÙNG: Dùng uống

- Viêm thực quản có trào ngược: Người lớn uống 30mg/lần/ngày, trong 4 - 8 tuần. Có thể dùng thêm 8 tuần nữa, nếu chưa khỏi. Liều duy trì 15mg/ngày.
- Loét dạ dày: 15 - 30mg/lần/ngày, dùng trong 4 - 8 tuần.
- Loét tá tràng: 15mg/lần/ngày, dùng trong 4 tuần hoặc đến khi khỏi bệnh.
- Tăng tiết toan khác (hội chứng Zollinger - Ellison): 60mg/lần/ngày.
- * Giảm liều cho người có bệnh gan nặng, không vượt quá 30mg/ngày.
- * Uống thuốc vào buổi sáng trước khi ăn, không cắn vỡ hoặc nhai viên nang.

* CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn cảm với thuốc.
- Có thai trong 3 tháng đầu.

* ĐƯỢC LỰC HỌC:

- Là dẫn chất benzimidazol có tác dụng chống tiết acid dạ dày, liên kết không thuận nghịch với H^+/K^+ ATPase là một hệ thống enzym có trên bề mặt tế bào thành dạ dày, do đó lansoprazol ức chế sự chuyển vận cuối cùng các ion hydrogen vào trong dạ dày. Vì hệ thống enzym H^+/K^+ ATPase được coi là chiết bơm acid (proton) của niêm mạc dạ dày, nên lansoprazol được gọi là chất ức chế bơm proton. Lansoprazol ức chế dạ dày tiết acid cơ bản và khi bị kích thích do bất kỳ tác nhân kích thích nào.
- Lansoprazol được dùng điều trị ngắn ngày chứng loét dạ dày - tá tràng và điều trị dài ngày các chứng tăng tiết dịch tiêu hóa bệnh lý (như hội chứng Zollinger - Ellison, u đa tuyến nội tiết, tăng đường bào hệ thống).
- Mức độ ức chế tiết acid dạ dày phụ thuộc vào liều dùng và thời gian điều trị, lansoprazol ức chế tiết acid tốt hơn các chất đối kháng thụ thể H_2 .
- Lansoprazol có thể ngăn chặn *Helicobacter pylori* ở người loét dạ dày - tá tràng bị nhiễm xoắn khuẩn này. Nếu phối hợp với một hoặc nhiều thuốc chống nhiễm khuẩn (như amoxicilin, clarithromycin) thì có hiệu quả hơn trong việc tiêu trừ vi khuẩn dạ dày do *H. Pylori*.

* ĐƯỢC ĐỘNG HỌC:

- Lansoprazol hấp thu nhanh, nồng độ tối đa trung bình đạt được trong khoảng 1,7 giờ sau khi uống, khả dụng sinh học tuyệt đối trên 80%. Nửa đời trong huyết tương là 1,5 ($\pm 1,0$) giờ. Nồng độ thuốc tối đa và diện tích dưới đường cong (AUC) đều giảm khoảng 50% nếu dùng thuốc khoảng 30 phút sau khi ăn.
- Lansoprazol liên kết với protein huyết tương khoảng 97%, chuyển hóa nhiều ở gan nhờ hệ enzym cytochrom P₄₅₀ để thành hai chất chuyển hóa chính: sulfon lansoprazol và hydroxy lansoprazol. Khoảng 20% thuốc dùng được bài tiết vào mật và nước tiểu.

- Thải trừ lansoprazol bị kéo dài ở người bị bệnh gan nặng, nhưng không thay đổi ở người suy thận nặng. Vì vậy, cần giảm liều đối với người bị bệnh gan nặng.

*** THẬN TRỌNG:**

- Giảm liều ở người bị bệnh gan.
- Người mang thai và cho con bú.

*** TƯƠNG TÁC THUỐC:**

- Được chuyển hóa nhờ hệ enzym cytochrom P₄₅₀ nên tương tác với các thuốc khác được chuyển hóa bởi cùng hệ enzym này. Vì vậy, không dùng Lansoprazol cùng với các thuốc khác cũng được chuyển hóa bởi cytochrom P₄₅₀.
- Làm giảm tác dụng của ketoconazol, itraconazol và của các thuốc khác có sự hấp thu cần môi trường acid.
- Sucralfat làm chậm và giảm hấp thu Lansoprazol (khoảng 30%).

*** TÁC DỤNG PHỤ:**

- Thường gặp: Đau đầu, chóng mặt, tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn, nôn, táo bón, khó tiêu, phát ban.
- Ít gặp: Mệt mỏi, tăng mức gastrin huyết thanh, enzym gan, hematocrit, hemoglobin, acid uric và protein niệu.
Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

*** SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

- Chưa có thông báo dùng lansoprazol cho người mang thai. Không biết rõ thuốc có đi qua nhau thai vào bào thai không. Tuy nhiên, dùng lâu và với liều cao đã gây ung thư trên cả chuột nhắt và chuột cống đực và cái, do vậy nên tránh dùng cho người mang thai, ít nhất là trong 3 tháng đầu, nhưng tốt nhất là không nên dùng trong bất kỳ giai đoạn nào khi thai nghén.
- Cả lansoprazol và các chất chuyển hóa đều bài tiết qua sữa ở chuột cống và có thể sẽ bài tiết qua sữa người mẹ. Vì tác dụng gây ung thư của thuốc trên súc vật đã được chứng minh, nên tránh dùng ở người cho con bú.

*** QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:**

- Triệu chứng: Hạ thân nhiệt, an thần, co giật, giảm tầng số hô hấp.
- Điều trị hỗ trợ: Phương pháp thẩm tách không loại được thuốc.

*** KHUYẾN CÁO:**

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ.
- Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ.
- Đeo xa tay trẻ em.

*** BẢO QUẢN:** Để nơi khô mát, tránh ánh sáng chiếu trực tiếp.

- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

*** TIÊU CHUẨN:** Tiêu chuẩn cơ sở