

# DOGARLIC® Trà Xanh

**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nén bao phim chứa:

- Tỏi (Bulbus Allii sativi) ..... 380 mg
- Nghệ (Rhizoma Curcumae longae) ..... 30 mg
- Trà xanh (Caulis et Folium Camelliae) ..... 175 mg

Tá dược: Lactose, tinh bột mì, povidon K90, colloidal silicon dioxide A200, natri benzoat, nipagin, nipasol, microcrystalline cellulose PH101, natri starch glycolat, magnesi stearat, hydroxypropyl methylcellulose 15cP, hydroxypropyl methylcellulose 6cP, polyethylene glycol 6000, talc, titan dioxide, màu quinolin yellow, màu patent blue V.

**DẠNG BÀO CHẾ:** Viên nén bao phim.

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:**

- Hộp 1 chai 100 viên.
- Hộp 10 vỉ x 10 viên.

**CHỈ ĐỊNH:**

Hạ cholesterol, điều hòa triglycerid, phòng bệnh thấp khớp.

Phòng và hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày gây bởi *Helicobacter pylori*.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:** Dùng uống

- Liều điều trị: 3 viên/lần, ngày 3 lần.

- Liều duy trì: 2 viên/lần, ngày 3 lần.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

**THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:**

Sử dụng nhiều Tỏi có thể làm tăng nguy cơ chảy máu sau phẫu thuật.

Trà gây khó ngủ nếu uống vào buổi tối trước khi đi ngủ.

**PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

Không nên sử dụng cho phụ nữ có thai khi không có chỉ định của bác sĩ.

Tỏi bài tiết qua sữa mẹ và tác dụng trên trẻ sơ sinh chưa được nghiên cứu. Không nên dùng khi không có chỉ định của bác sĩ.

**ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:**

Thuốc không ảnh hưởng khi lái xe và vận hành máy móc.

**TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:**

Dùng đồng thời với warfarin có thể làm tăng thời gian chảy máu.

Không nên uống cùng với sữa.

Nhằm tránh các tương tác có thể xảy ra giữa các thuốc, cần báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ các thuốc đang sử dụng.

## TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Thuốc có thể gây viêm da tiếp xúc, gây cơn hen suyễn khi hít phải, dị ứng, kích ứng đường tiêu hóa, ợ nóng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, có mùi Tỏi trong hơi thở và ở da.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

## QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Chưa có báo cáo liên quan đến quá liều của thuốc. Không có phản ứng có hại, tuy nhiên cần phải sử dụng đúng liều chỉ định.

## ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:

Tỏi có tác dụng chống xơ vữa động mạch, hạ lipid máu, chống sự tăng huyết áp, chống lại sự kết tập tiểu cầu, giãn mạch và là chất chống oxy hóa hiệu quả.

Trà xanh có tác dụng lợi tiểu, kích thích ăn ngon, chữa tiêu chảy, chống oxy hóa, chống đái tháo đường.

Nghệ có tác dụng làm giảm cholesterol và lipid máu, kháng khuẩn, chống viêm, chống oxy hóa, chống loét dạ dày và rối loạn tiêu hóa.

Qua kết quả nghiên cứu được lý lâm sàng về tác dụng kháng khuẩn *Helicobacter pylori* của Dogarlic-Trà xanh cho thấy có tác dụng kháng khuẩn *Helicobacter pylori* ở cả hai đối tượng nhiễm khuẩn dù có hay không có triệu chứng viêm loét dạ dày. Hiệu năng của chế phẩm tỷ lệ thuận với liều lượng và thời gian điều trị. Tác dụng tuy không rõ ràng trong 2 tuần đầu nhưng tích lũy với hiệu năng mong muốn sau 4 tuần áp dụng.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30 °C, tránh ánh sáng.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

**NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.**

**ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.**

## NHÀ SẢN XUẤT:



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO**

Cụm Công nghiệp Cân Lõi, Ấp An Định, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3851950