

R_X THUỐC BÁN THEO ĐƠN

DOSPASMIN® 60_{mg}

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nang cứng chứa:

- Alverin citrat 60 mg
- Tá dược: Tinh bột khoai tây, Povidon K30, acid Citric, Natri croscarmellose, Magnesi stearat, Colloidal silicon dioxide A200, nang cứng gelatin (số 4).

DẠNG BẢO CHẾ

Viên nang cứng, dùng uống.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

- Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ hoặc 10 vỉ x 10 viên.
- Hộp 1 chai 20 viên hoặc 100 viên.

CHỈ ĐỊNH

Chống đau do co thắt cơ trơn đường tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích, bệnh đau túi thừa ruột kết, đau do co thắt đường mật, cơn đau quặn thận, thống kinh nguyên phát.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Dùng uống:

Người lớn, người cao tuổi: Uống 1 - 2 viên/lần, ngày 1 - 3 lần.

Trẻ em dưới 12 tuổi không nên dùng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Tắc ruột hoặc liệt ruột.
- Tắc ruột do phân.
- Mắt trương lực đại tràng.

THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG

Phải đi khám lại nếu xuất hiện các triệu chứng mới hoặc các triệu chứng còn dai dẳng, xấu hơn, không cải thiện sau 2 tuần điều trị.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

* Thời kỳ mang thai: Không nên dùng thuốc trong thời kỳ mang thai vì bằng chứng về độ an toàn trong các nghiên cứu tiền lâm sàng còn giới hạn.

* Thời kỳ cho con bú: Không nên dùng thuốc trong thời kỳ cho con bú vì bằng chứng về độ an toàn còn giới hạn.

ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Nếu cảm thấy chóng mặt khi uống

thuốc, nên tránh lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC

Chưa thấy có tương tác với bất cứ thuốc nào.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, ngứa, phát ban, phản ứng dị ứng (kể cả phản vệ).

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

- Triệu chứng: Hạ huyết áp và triệu chứng nhiễm độc giống atropin.

- Xử trí: Như khi ngộ độc atropin và biện pháp hỗ trợ điều trị hạ huyết áp.

DƯỢC LỰC HỌC

Alverin citrat có tác dụng trực tiếp đặc hiệu chống co thắt cơ trơn ở đường tiêu hóa và tử cung.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Sau khi được hấp thu từ đường tiêu hóa, alverin citrat chuyển hóa nhanh chóng thành chất chuyển hóa có hoạt tính, nồng độ cao nhất trong huyết tương đạt được sau khi uống 1 - 1,5 giờ. Sau đó thuốc được chuyển hóa tiếp thành các chất không còn hoạt tính và được thải trừ ra nước tiểu bằng bài tiết tích cực ở thận.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

NHÀ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI:



DOMESCO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
DOMESCO**

Địa chỉ: 346 đường Nguyễn Huệ,
P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 1800.969.660