

# R<sub>x</sub> LINH CHI

- Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Tờ hướng dẫn sử dụng nêu tóm tắt các thông tin quan trọng của thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

**THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC:** Mỗi viên nang cứng chứa:

**Thành phần dược chất:** Cao lỏng Linh chi (10/1) (tương đương 600 mg Linh chi - *Ganoderma lucidum*) 60 mg.

**Thành phần tá dược:** Natri benzoat, Màu caramel, Lactose, Povidon K90, Colloidal silicon dioxide A200, Magnesi stearat, Nang cứng gelatin (số 1).

**DẠNG BẢO CHẾ:** Viên nang cứng.

**Mô tả đặc điểm bên ngoài của thuốc:** Viên nang cứng số 1, thân nang màu đỏ, nắp nang màu đỏ. Bên trong chứa bột thuốc màu nâu, đồng nhất trong cùng một lô, có mùi thơm dược liệu.

## CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị suy nhược thần kinh, chóng mặt, mất ngủ, viêm gan mạn tính, viêm phế quản mạn tính, bệnh tăng huyết áp, tăng cholesterol máu, bệnh động mạch vành tim, loét đường tiêu hóa mạn tính, thấp khớp, thống phong.

- Tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể.

## LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:

### Liều dùng:

**Luôn dùng thuốc đúng liều lượng trong đơn thuốc.**

Ngày 2 - 3 lần, mỗi lần 1 - 2 viên.

**Cách dùng:** Dùng uống với nước ấm.

Trường hợp quên uống một liều dùng: Hãy uống ngay khi nhớ ra. Nếu thời gian gần với lần dùng thuốc tiếp theo, bỏ qua liều đã quên và hãy dùng liều tiếp theo vào thời gian thường lệ. Không dùng liều gấp đôi để bù vào liều đã quên.

Trường hợp uống quá nhiều viên thuốc: Hãy gặp ngay bác sĩ hoặc tới khoa Hồi sức - Cấp cứu của bệnh viện gần nhất.

## CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

## CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

- Natri benzoat có thể làm tăng chứng vàng da (vàng da và mắt) ở trẻ sơ sinh (đến 4 tuần tuổi).

- Bệnh nhân có vấn đề về dung nạp galactose, bệnh nhân thiếu hụt enzym Lapp lactase hoặc kém hấp thu glucose-galactose không nên dùng thuốc này.

## Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- **Thời kỳ mang thai:** Chưa có tài liệu nào xác nhận phản ứng có hại gây nguy hiểm khi dùng thuốc nhưng thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ có thai.

- **Thời kỳ cho con bú:** Chưa có tài liệu nào xác nhận phản ứng có hại gây nguy hiểm khi dùng thuốc nhưng thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ cho con bú.

## Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

## TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC:

### Tương tác của thuốc:

Chưa có báo cáo.

### Tương kỵ của thuốc:

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc dùng đường uống, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

## TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

## QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

### Triệu chứng và biểu hiện khi sử dụng thuốc quá liều:

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

### Cách xử trí khi dùng thuốc quá liều:

Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

## QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 1 túi nhôm x 1 vỉ x 10 viên, hộp 1 túi nhôm x 4 vỉ x 10 viên, hộp 2 túi nhôm x 5 vỉ x 10 viên.

**ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30 °C, tránh ánh sáng.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:** TCCS.

## CƠ SỞ SẢN XUẤT:



DOMESCO

## CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cấn Lộ, Ấp An Định, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 1800.969.660